

1 Fragen zu Definitionen

6.) Basisbeispiele

Kennst du ein Beispiel für eine Subbasis in einem Topologischen Raum, die keine Basis ist?

Wie ist es mit folgendem?

Sei (X, \mathfrak{T}) ein topologischer Raum mit $X = \{0, 1, 2\}$ und $\mathfrak{T} = \{\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}, X\}$.
Dann ist $\mathcal{S} = \{\emptyset, \{0, 1\}, \{0, 2\}\}$ eine Subbasis von \mathfrak{T} , da gilt:

- $\emptyset \in \mathcal{S}$
- $\{0\} = \{0, 1\} \cap \{0, 2\}$
- $\{0, 1\} \in \mathcal{S}$
- $X = \{0, 1\} \cup \{0, 2\}$

Allerdings ist \mathcal{S} keine Basis von (X, \mathfrak{T}) , da $\{0\}$ nicht als Vereinigung von Elementen aus \mathcal{S} erzeugt werden kann.

9.) Mannigfaltigkeit mit Rand

Definition 1

Sei X ein topologischer Raum und $n \in \mathbb{N}$.

- a) Eine n -dimensionale **Karte** auf X ist ein Paar (U, φ) , wobei $U \subseteq X$ offen und $\varphi : U \rightarrow V$ Homöomorphismus von U auf eine offene Teilmenge $V \subseteq \mathbb{R}^n$.
- b) Ein n -dimensionaler **Atlas** \mathcal{A} auf X ist eine Familie $(U_i, \varphi_i)_{i \in I}$ von Karten auf X , sodass $\bigcup_{i \in I} U_i = X$.

- c) X heißt (topologische) n -dimensionale **Mannigfaltigkeit**, wenn X hausdorffsch ist, eine abzählbare Basis der Topologie hat und ein n -dimensionalen Atlas besitzt.

Definition 2

Sei X ein Hausdorffraum mit abzählbarer Basis der Topologie. X heißt n -dimensionale **Mannigfaltigkeit mit Rand**, wenn es einen Atlas (U_i, φ_i) gibt, wobei $U_i \subseteq X_i$ offen und φ_i ein Homöomorphismus auf eine offene Teilmenge von

$$R_{+,0}^n := \{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_m \geq 0 \}$$

ist.

Sind Mannigfaltigkeiten mit Rand auch Mannigfaltigkeiten? Sollte das rote m eventuell n sein? Oder sollte es ein i sein, mit $i = 1..n$?

Laut https://de.wikipedia.org/wiki/Mannigfaltigkeit_mit_Rand:

„Eine Mannigfaltigkeit mit Rand ist mathematisches Objekt aus der Differentialgeometrie. Es handelt sich hierbei nicht um einen Spezialfall einer Mannigfaltigkeit, sondern ganz im Gegenteil um eine Verallgemeinerung.“

Ist die Aussage auf Wikipedia korrekt? Für mich sieht das so aus, also ob folgende Definition auch richtig wäre:

Definition 3

Sei X eine Mannigfaltigkeit mit Atlas \mathcal{A} und

$$\mathbb{R}_{+,0}^n := \{ (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_m \geq 0 \}$$

X heißt **Mannigfaltigkeit mit Rand**, wenn gilt:

$$\forall (U, \varphi) \in \mathcal{A} : \varphi(U) \subseteq \mathbb{R}_{+,0}^n$$

11.) Produkttopologie

Definition 4

Seien X_1, X_2 topologische Räume.

$U \subseteq X_1 \times X_2$ sei offen, wenn es zu jedem $x = (x_1, x_2) \in U$ Umgebungen U_i um x_i mit $i = 1, 2$ gibt, sodass $U_1 \times U_2 \subseteq U$ gilt.

$\mathfrak{T} = \{ U \subseteq X_1 \times X_2 \mid U \text{ offen} \}$ ist eine Topologie auf $X_1 \times X_2$. Sie heißt **Produkttopologie**. $\mathfrak{B} = \{ U_1 \times U_2 \mid U_i \text{ offen in } X_i, i = 1, 2 \}$ ist eine Basis von \mathfrak{T} .

Gibt es ein Beispiel, das zeigt, dass nicht $\mathfrak{B} = \mathfrak{T}$ gilt?

15.) Existenz der Parallelen

Definition 5

§5) **Parallelenaxiom:** Für jedes $g \in G$ und jedes $P \in X \setminus g$ gibt es höchstens ein $h \in G$ mit $h \cap g = \emptyset$. h heißt **Parallele zu g durch P** .

Wie beweist man, dass es genau eine gibt? (Verschiebung der Geraden in den entsprechenden Punkt mit der Isometrie, die die Halbebenen gleich lässt)

17.) Simpliciale Abbildungen

Wenn man Simpliciale Abbildungen wie folgt definiert

Definition 6

Seien K, L Simplicialkomplexe. Eine stetige Abbildung

$$f : |K| \rightarrow |L|$$

heißt **simplicial**, wenn für jedes $\Delta \in K$ gilt:

- a) $f(\Delta) \in L$
- b) $f|_{\Delta} : \Delta \rightarrow f(\Delta)$ ist eine affine Abbildung.

Dann ist die Forderung „ $f(\Delta) \in L$ “ doch immer erfüllt, oder? Gibt es eine Abbildung $f : |K| \rightarrow |L|$ mit $f(\Delta) \notin L$?

18.) ÜB 1, Aufgabe 2

Vor.: Es sei (X, d) ein metrischer Raum, $A \subseteq X$. Weiter bezeichne \mathfrak{T} die von d auf X erzeugte Topologie \mathfrak{T}' , die von der auf $A \times A$ eingeschränkten Metrik $d|_{A \times A}$ erzeugte Topologie.

Beh.: Die Topologie \mathfrak{T}' und $\mathfrak{T}|_A$ (Spurtopologie) stimmen überein.

Bew.:

„ $\mathfrak{T}|_A \subseteq \mathfrak{T}'$ “:

Sei $U \in \mathfrak{T}|_A = \{ V \cap A \mid V \in \mathfrak{T} \}$.

Dann ex. also $V \in \mathfrak{T}$ mit $U = V \cap A$.

Sei $x \in U$.

Da $V \in \mathfrak{T}$, ex. nach Bemerkung 3 ein $r > 0$ mit

$$\begin{aligned}\mathfrak{B}_r(x) &:= \{ y \in X \mid d(x, y) < r \} \subseteq V \\ &\quad \{ y \in A \mid d(x, y) < r \} \subseteq V \cap A = U\end{aligned}$$

also ist U offen bzgl. $d|_{A \times A}$.

Wieso ist U offen bzgl. $d|_{A \times A}$?

Da $x \in U$ beliebig gewählt war gilt: $\mathfrak{T}|_A \subseteq \mathfrak{T}'$